



O MONTADO DE AZINHO DOMINA A PAISAGEM DE MONTE BARATA | Holm oak groves dominate the landscape in Monte Barata

AZINHEIRA | Holm oak - *Quercus rotundifolia* Eudicotiledonea / Fagaceae



Este carvalho está particularmente bem adaptado ao clima mediterrânico e consegue sobreviver em solos muito pobres, como os solos de xisto de Monte Barata. A bolota (em baixo), o fruto da azinheira, é uma rica fonte de nutrientes para animais silvestres e domésticos, como os porcos.

This oak is well adapted to the Mediterranean climate and survives in very poor soils, such as the schistose soil of Monte Barata. The acorns (below), the fruit of holm oak, are very rich in nutrients and are an important food source for wild and domestic animals, such as the pigs.

© Eva Monteiro



© Ambiodiv

ARBUSTOS QUE ACOMPANHAM A AZINHEIRA EM ZONAS MAIS FECHADAS DO MONTADO | Shrubs found near holm oaks in Monte Barata



Época de floração: Abril a Junho
Blooming season: April to June

© Patricia Garcia Pereira

SARGAÇO | *Salvia cistus - Cistus salvifolius*
Eudicotiledonea / Cistaceae



Esta lagarta alimenta-se de diferentes plantas do género *Cistus*.
This caterpillar feeds on different *Cistus* species.

© Frank Pennekamp

LOTI - *Psilogaster loti*
Insecta/Lepidoptera/Lasiocampidae



Época de floração: Fevereiro a Julho
Blooming season: February to July

© Frank Pennekamp

ROSMANINHO-MAIOR | Lavender - *Lavandula pedunculata*
Eudicotiledonea / Lamiaceae



Em Monte barata existe a subespécie *viscosum* que, como o nome indica, tem folhas viscosas ao toque.
Época de floração: Março a Maio
The sub-species *viscosum* can be found in Monte Barata. It has viscous leaves, as the name suggests.
Blooming season: March to May

© Paulo Rocha Monteiro

ERVA-SARGACINHA - *Halimium umbellatum*
Eudicotiledonea / Cistaceae